

Số: 10 / UBND-KT  
Về việc phòng chống rét cho  
cây trồng, vật nuôi

Bìm Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: UBND các xã, phường.

Hiện nay toàn miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh gây nên rét đậm, rét hại kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng vật nuôi. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW tình trạng rét đậm, rét hại còn kéo dài 4-5 ngày tới. Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra cho cây trồng, vật nuôi. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thị xã Bìm Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

### I. ĐỐI VỚI CÂY LÚA:

#### 1. Đối với trà xuân sớm:

Chăm sóc để mạ khỏe trước khi đưa cấy: Trong tình hình thời tiết hiện nay phải giữ ấm, tăng cường bón tro bếp để chống rét cho mạ, tuyệt đối không được bón đậm Urê và NPK.

#### 2. Đối với trà Xuân muộn:

\* Phương thức gieo mạ:

- Lượng mầm chia đều theo từng luống và gieo làm hai lần, gieo đi gieo lại phủ đều trên mặt luống. Gieo xong dùng vật mềm dập nhẹ cho hạt chìm hết trong bùn hoa và dùng tro bếp hoai ải phủ đều mặt luống.

- Luống gieo mạ dùng để phủ nilon rộng từ 1-1,2 m, độ dày bùn + phân từ 3-5cm.

- Lượng phân cho luống mạ 10m<sup>2</sup>: Phân chuồng mục ải: 5-10kg, phân NPK 5:10:3 Lâm Thao 0,5kg, bùn ao + phân nhào nhuyễn trang mặt phẳng mu rùa thoát nước 2 bên.

- Sau khi gieo mạ xong làm giá đỡ phủ kín bằng nilon trắng.

- Yêu cầu: 100% diện tích mạ phải phủ nilon, nilon được căng đều trên giá khung đỡ kín cả hai bên mép luống và hai đầu luống, dùng đát chặn giữ bốn xung quanh luống để chống gió lật.

- Tuổi mạ: 3,5-4 lá, mạ cây vào những ngày ám nhiệt độ phải > 15<sup>0</sup>C.

\* Chăm sóc mạ:

Cần chú ý khâu chăm sóc như sau:

- Nếu trời rét đậm kéo dài: Không để luồng mạ khô nứt nẻ, hàng ngày từ 10-14 giờ mở thông gió ở 2 đầu luồng.

- Nếu thời tiết rét, lạnh bình thường: Hàng ngày từ 9-16 giờ lật nilon về bên mép luồng.

(Cả hai trường hợp trên về tối đều phải phủ nilon lại như cũ. Nếu nhiệt độ từ 20-25°C thì mở thoáng hai đầu luồng.)

- Thời gian cây mạ ngắn từ 10-15 ngày, cây khi mạ đạt 2,5 - 3,5 lá.

- Mạ trước khi cây 3-4 ngày có thể không phủ nilon hoặc chỉ phủ ban đêm nếu trời rét giá để mạ thích hợp dần với ngoại cảnh.

- Mạ gieo trên nền đất cứng che phủ nilon xúc để cây, cây đặt nhẹ tay, mật độ từ 45-50 khóm/m<sup>2</sup>, cây 2-3 rãnh/1 khóm

- Có thể phun thuốc trừ cỏ sau khi gieo 12 ngày, phun thuốc phòng sâu và bệnh cho lúa trước khi nhổ cây 3 ngày

**Chú ý:** Sản xuất vụ Chiêm Xuân phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết vì vậy đề nghị các đơn vị khi nhiệt độ ngoài trời trên 15°C mới thực hiện gieo mạ và cây, đồng thời bố trí lượng giống dự phòng 5-10% bằng các giống lúa ngắn ngày để chủ động khắc phục khi cần thiết.

## II. ĐỐI VỚI VẬT NUÔI:

**1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền:** Phổ biến các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận người chăn nuôi. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu, đặc biệt những đợt rét đậm, rét hại để chủ động phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm có hiệu quả.

### 2. Cung cấp chuồng trại, chủ động thức ăn cho vật nuôi:

- Hướng dẫn người chăn nuôi sửa chữa, nâng cấp, che chắn chuồng trại, phòng chống mưa, rét, gió lùa; chuồng nuôi phải đủ diện tích và đảm bảo điều kiện vệ sinh, cách ly với nguồn bệnh; có hệ thống sưởi ấm bằng bóng điện tròn hoặc bố trí chỗ đốt củi, than, sưởi cho gia súc, gia cầm( đặc biệt là gia súc, gia cầm non) trong những ngày giá rét; dự phòng bạt, phân nửa để khi rét đậm, rét hại dùng để quây chuồng nuôi.

- Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ nguồn thức ăn( mua dự trữ rơm, cỏ khô; tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp; áp dụng phương pháp chế biến thực ăn như ủ rơm u rê, ủ chua thân cây ngô, ngọn mía, để nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

### 3. Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Tăng cường cho vật nuôi ăn các thức ăn giàu đạm, đầy đủ Vitamin, muối khoáng(muối ăn, bột xương), bổ sung thêm tinh bột, thức ăn xanh để cơ thể khỏe mạnh, đủ năng lượng chống rét, phòng chống dịch bệnh xâm nhập.

+ Đối với gia cầm: Nên cho uống bổ sung thêm chất điện giải, B.complex, uống nước ấm, ăn cám chất lượng cao để con vật khỏe mạnh, nâng cao khả năng chống bệnh.

+ Đối với lợn: Cần cho ăn, uống ấm, cho ăn thêm muối ăn (NaCL: 0.1g/kg thể trọng), bổ sung thêm chất đạm trong khẩu phần ăn (có nhiều đậu tương, bã đậu, khô dầu lạc hoặc tôm, cua, cá, thức ăn tổng hợp hoặc đạm đặc), ăn tăng hàm lượng chất tinh (có nhiều gạo, ngô, khoai, sắn), uống thêm B.complex (vitamin tổng hợp) và ăn đủ thức ăn xanh, thức ăn ủ chua như: cây ngô, lá sắn, thân lá cây lạc, dây lá khoai lang (chất xơ) để đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng để chống rét và dịch bệnh có thể xảy ra.

+ Đối với trâu bò: Tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Bổ sung thêm tinh bột (cám gạo, gạo, ngô, khoai, sắn) với lượng 0,5g/kg thể trọng. Cho uống thêm muối ăn với lượng 5g/100kg thể trọng, hòa vào nước ấm cho uống. Cho ăn thêm đạm urê với lượng 20g/100kg thể trọng/ ngày, cách cho ăn như sau: Hoà tan lượng đạm urê với nước sạch, vẩy đều vào rơm hoặc cỏ cho trâu, bò ăn hết trong ngày; không được hoà urê vào nước cho trâu bò uống vì chỉ có vào dạ cỏ dưới tác dụng của vi sinh vật đạm urê mới được hấp thu, nếu cho trâu bò uống sẽ bị tiêu chảy. Cho trâu bò thức ăn ủ chua như: cây ngô, lá sắn, thân lá cây lạc, dây lá khoai lang. Lượng thức ăn như sau: Trâu, bò cày kéo 10-15kg/ngày và ăn thêm cỏ xanh, rơm, trâu, bò ăn trong mùa đông: 5-6 kg/ngày, ăn thêm rơm, chăn thả. Khi trâu, bò được ăn thêm thức ăn ủ chua chúng sẽ béo, khỏe, lớn nhanh, cày kéo tốt và tiết kiệm được thức ăn tinh bột bổ sung.

- Khi nhiệt độ xuống dưới 12°C, cần thực hiện đưa trâu bò về chuồng, lán tạm, tuyệt đối không thả rông tự do ngoài đồng, ngoài bãi chăn thả, trên rừng qua đêm. Cho trâu, bò nghỉ làm việc và cho ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng; dùng chăn, bao tải khoác cho trâu, bò; theo dõi chặt chẽ sức khoẻ đàn gia súc, phát hiện sớm các trường hợp gia súc có biểu hiện đói, rét, dịch bệnh để kịp thời xử lý.

### III. ĐỐI VỚI THỦY SẢN:

- Đối với đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là đối tượng chịu rét rất kém như cá lóc, cá rô phi.. chỉ đạo tập trung thu hoạch.

- Đối với cá bố mẹ và cá giống, cá nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm. Áp dụng các biện pháp chống rét:

+ Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu từ 1,5 – 2,0m.

- + Thả bèo tây trên mặt ao chiếm 1/2 -2/3 diện tích ao nuôi.
- + Thả sọt tránh rét cho cá ở góc ao phía bắc của ao nuôi, sử dụng các sọt đan bằng tre nứa, đưa vào sọt các búi rơm tạo giá thể để cá trú ẩn tránh rét.
- + Những cơ sở có điều kiện có thể làm khung và che phủ bì mặt ao bằng nilon màu áng để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt độ cho nước ao nuôi và khi trời nắng sẽ tăng khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời bổ sung nhiệt cho ao nuôi.

- Chăm sóc đàn thủy sản nuôi:

- + Cho ăn đầy đủ, sử dụng thức ăn có chất lượng cao, bổ sung thêm Vitamin C và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Khi nhiệt độ xuống dưới 12°C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm nắng ám trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến...

+ Hàng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa các loại phân xuống ao làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước. Bổ sung lượng nước cần thiết để đảm bảo độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Quan sát, theo dõi sức khỏe của đối tượng nuôi để xử lý kịp thời, không kéo lười kiểm tra hoặc thu tĩa khi trời rét đậm, rét hại.

**UBND Thị xã giao nhiệm vụ:**

- *Phòng Kinh tế:*

+ Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu; kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thị xã; Tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; nắm chắc tình hình gieo cấy, chủ động cân đối đủ nguồn giống, vật tư, đảm bảo chất lượng và số lượng để hoàn thành kế hoạch về diện tích và cơ cấu cây trồng, vật nuôi vụ Chiêm Xuân 2017-2018.

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét của các đơn vị.

- *Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn:* Bố trí lịch bơm nước hợp lý để đảm bảo phục vụ bà con nông dân phòng chống rét và chăm sóc cây trồng vụ Chiêm Xuân 2017-2018 thuận lợi, hiệu quả.

- *Trạm BVTV Thị xã:* Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh, chuột gây hại lúa, màu. Chú ý các loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây mạ trong giai đoạn hiện nay.

- *Trạm Thú y:* Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, khắc phục tình trạng gia súc, gia cầm chết do đói rét và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc.

*- Đài Truyền thanh và Truyền hình Thị xã:* Tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời thông tin về tình hình thời tiết và các biện pháp phòng chống rét, chăm sóc cho cây trồng vật nuôi để mọi người dân trên địa thị xã bàn nắm rõ.

Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các ngành có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./.

*Noi nhận:*

- Như trên;
- TT.Thị uỷ, HĐND Thị xã;
- UBND Thị xã (b/c);
- Các đơn vị có liên quan (t/h);
- Các đ/c Bí thư Đảng ủy các xã, phường( để chỉ đạo t/h);
- Lưu: VT,KT.



TÔNG THANH BÌNH